Stephen Typaldos

Faszien Distorsions Modell

Die Verbindung von Orthopädie und Osteopathie n. Typaldos

***zum Bestellen hier klicken/
to order click here***

by naturmed Fachbuchvertrieb

Aidenbachstr. 78, 81379 München

Tel.: + 49 89 7499-156, Fax: + 49 89 7499-157

Email: info@naturmed.de, Web: <http://www.naturmed.de>

INHALTSVERZEICHNIS

ERSTER TEIL: EINFÜHRUNG IN THEORIE UND PRAXIS

Kapitel	Seite
1. Einführung.....	3
2. Geschick und Muskelkraft bei FDM - Techniken	15
3. Triggerbänder und Triggerbandtechnik.....	19
4. Hernierte Triggerpunkte und die Therapie für hernierte Triggerpunkte.....	27
5. Continuumdistorsionen und Continuumtechnik	31
6. Faltdistorsionen und Faltechnik.....	37
7. Zylinderdistorsionen und Zylindertechnik.....	47
8. Tektonische Fixierung und tektonische Technik.....	53

ZWEITER TEIL: MEDIZINISCHE FDM KONZEPTE

9. Orthopädie.....	63
10. Neurologie und Rehabilitation	85
11. Innere Medizin	107

DRITTER TEIL: FDM THERAPIE BEI MUSKULOSKELETTALEN VERLETZUNGEN

12. Nacken- und Rückenschmerzen.....	125
13. Schulterschmerzen	139
14. Beschwerden in den oberen Extremitäten	159
15. Beschwerden in den unteren Extremitäten	177
16. Knöchelverstauchungen	203

VIERTER TEIL: KRANKENGESCHICHTEN.....221

FÜNFTER TEIL: ANHANG & GLOSSAR

Zusammenfassung der häufigsten Beschwerden, Körpersprache und FDM Behandlungen	253
FDM Abkürzungen.....	264
Tafel mit Unterarten von Faszien­distorsionen	265
Glossar.....	269

EINFÜHRUNG

Das Faszien­distor­si­ons­mo­dell (FDM) ist ein ana­to­mi­sches Mo­dell, dem­zu­fol­ge die zu­grun­de­lie­gen­de Ur­sa­che buch­stäb­lich je­der mus­ku­lo­ske­let­ta­len Ver­let­zung (und auch vie­ler neu­ro­lo­gi­schen und me­di­zi­ni­schen Er­krankun­gen) als ei­ner oder meh­re­re von in­ge­sam­st sechs pa­tho­lo­gi­schen Ver­än­de­run­gen des men­schen­li­chen Bin­de­ge­we­bes (Fas­zi­en­bän­der, Li­ga­men­te, Seh­nen, Re­ti­na­ku­la, etc.) be­trach­tet wird. Die­ses Mo­dell er­mög­licht nicht nur un­glaub­lich ef­fek­ti­ve ma­nipu­la­ti­ve The­ra­pi­en für di­ver­se Be­schwer­den wie Mus­kel­zer­run­gen, Fra­k­tu­ren und Schul­ter­stei­fe, son­dern die Re­su­l­ta­te sind auch ob­jek­ti­v, sicht­bar, mess­bar und un­mit­tel­bar.

Bei der ma­nipu­la­ti­ven An­wen­dung des FDMs (be­kannt als Ty­pal­dos Ma­nu­al The­ra­pie oder TMT), wird je­de Ver­let­zung auf der Grund­la­ge der sub­jek­ti­ven Be­schwer­den, wie Kör­per­spra­che, Ver­let­zungs­me­cha­nis­mus und ob­jek­ti­ve An­zei­chen be­trach­tet und die­se As­pek­te fü­gen sich zu­sam­men zu ei­ner wich­ti­gen Dia­gno­se, die prak­ti­sche An­wen­dung fin­det. Zum Bei­spiel wird im Ge­gen­satz zur Or­tho­pä­die, wo ein ge­stauch­ter Knöchel ru­hig­ge­stellt wird, da­mit die ver­drehten Li­ga­men­te heilen könn­en, beim FDM - An­satz ei­ne spe­zi­fi­sche ana­to­mi­sche Dis­tor­si­onen der Kap­sel, der Li­ga­men­te oder der um­lie­gen­den Fas­zie phy­si­ka­lisch um­ge­kehrt. Som­it gibt es kei­ne ana­to­mi­sche Ver­let­zung mehr und der Pa­ti­ent kann ohne zu hin­ken gehen und ist schmerz­frei. Der ty­pi­sche Ab­lauf ei­ner or­tho­pä­dischen In­ter­ven­ti­on mit ob­li­ga­to­ri­schen Maß­nah­men (Ru­hestel­lung, Eis, Druck­verband, Hoch­le­gen, ent­zün­dungs­hem­men­de Me­di­ka­men­te und Krücken) wird nicht län­ger als klinisch re­le­vant erach­tet.

Die An­wen­dung von FDM in der Me­di­zin und bei Ein­grif­fen (be­kannt als Fas­zi­en­distor­si­ons­me­di­zin, wo­bei auch die Ab­kür­zung FDM ver­wen­det wird) er­mög­licht bei ei­ner gro­ßen An­zahl von me­di­zi­ni­schen und neu­ro­lo­gi­schen Er­krankun­gen ei­ne fas­zia­le Be­trach­tungs­wei­se und ei­ne ma­nipu­la­ti­ve Be­hand­lung. In ei­ni­gen Fäl­len er­setzt ein An­satz aus dem FDM das me­di­zi­ni­sche Pro­to­koll (wie zum Bei­spiel bei Nie­ren­ko­li­ken), wäh­rend bei an­de­ren Er­krankun­gen die Be­hand­lung er­gänzt wird (wie zum Bei­spiel bei ei­ner Pan­kreati­ti­is). Die größ­te Wir­kung über­haupt wird wahr­schein­lich in der Kar­di­o­lo­gie er­zielt. Auf die­sem Ge­biet wur­den neue Ope­ra­ti­ons­me­tho­den, elek­tri­sche und phar­ma­zeu­ti­sche Ein­grif­fe auf der Ba­sis des Fas­zi­en­distor­si­ons­mo­dells ent­wickelt, die in­ner­halb kür­zes­ter Zeit den Weg für ei­ne Prä­ven­ti­on von Myo­kar­din­far­kten eb­nen könn­ten und die Mög­lich­keit zu ei­ner Vor­aus­sa­ge er­öffnen, wer an­fäll­ig ist und das Fort­schrei­ten stop­pen soll­te.

DIE WICHTIGSTEN FASZIENDISTORSIONSTYPEN

Triggerband	—	verdrehtes Faszi­en­band
Triggerpunkt-Hernie	—	abnormale Protru­si­on von Ge­we­be durch ei­ne Fas­zi­en­ebene
Continuumdistor­si­on	—	Ver­än­de­rung der Ü­ber­gangs­zone zwi­schen Li­ga­ment, Seh­ne oder an­de­rem Bin­de­ge­we­be und Kno­chen
Faltdistor­si­on	—	dreidimen­si­o­nale Ver­än­de­rung ei­ner Fas­zi­en­ebene
Zylinderdistor­si­on	—	Über­lap­pung der fas­zia­len zylin­dri­schen Spi­ra­lwin­dun­gen
Tektonische Fixie­rung	—	Ver­än­de­rung der Gleit­fä­hig­keit der Fas­zi­en­ober­flä­chen

Gegenüberstellung der Hauptarten von Faszienstörungen

Hauptarten	Definition	Künstlerische Rendition	üblicherweise damit verbundene Körpersprache
Triggerband	verdrehtes Faszienband		Streichbewegung der Finger entlang des linearen Schmerzverlaufs
Hernierter Triggerpunkt	Austreten des Gewebes durch die Faszienebene		Drücken der Finger, des Daumens oder Fingerknöchels in das ausgetretene Gewebe
Continuum-Distorsion	Veränderung der Übergangszone zwischen verschiedenen Gewebsarten		Zeigen mit einem Finger auf einen oder mehrere Schmerzpunkte
Falt-Distorsion	Dreidimensionale Veränderung der Faszienebene		<u>Extremitäten:</u> Halten des Gelenkes <u>Rücken:</u> Handrücken oder Faust an die Wirbelsäule halten
Zylinder-Distorsion	Verwicklung der zirkulären Faszie		1. Wiederholtes Kneten der Weichteile 2. Ausladende Streichbewegung der Handfläche entlang des betroffenen Areales
Tektonische Fixierung	Gleitfähigkeitsverlust der Faszienoberfläche		<u>Schulter:</u> anteriore Rotation mit Abduktion <u>Hüfte:</u> Hand wird auf den Beckenkamm gelegt <u>Tiefer Rücken:</u> wiederholte Drehung der Wirbelsäule

Die FDM Philosophie zur Definition der Art einer vorliegenden Faszien­distor­sion in Verbindung mit einer Verletzung und der Korrektur, die eine nach der anderen mit der entsprechenden TMT Technik erfolgt, ist an folgenden klinischen Fällen dargestellt:

Klinischer Fall Nr. 1

Fr. F. ist eine 74 Jahre alte Frau, die an der Küste hingefallen ist und sich dabei eine Kompressionsfraktur des distalen Radius zugezogen hatte. Sie wurde zuerst in einer Notfallaufnahme untersucht, ein Röntgenbild wurde erstellt und man verordnete ihr eine Schlinge und eine Schiene mit der Anweisung, zum Eingipsen zurückzukommen. Sie lehnte dies allerdings ab (besorgt wegen einer möglichen fortdauernden Steifheit) und stattdessen wurde sie drei Tage später nochmals untersucht und mit Typaldos manueller Therapie behandelt.

Abbildung 1-1. Röntgenbild der distalen Radiusfraktur.

Bei der Untersuchung wurde eine Schwellung und ein Bluterguss im Handgelenk, im Unterarm und in den Fingern festgestellt. Eine Bewegungseinschränkung lag bei Extension, Flexion, Pronation und Supination vor. Auf die Frage, wo sie Beschwerden habe, zeigte sie folgende Körpersprache:

1. Streichbewegung der Finger entlang des lateralen Unterarmes (Triggerbänder).
2. Zeigen auf einen Schmerzpunkt mit einem Finger innerhalb der Frakturlinie (Continuumdistor­sion).
3. Halten des Handgelenkes mit der anderen Hand (Faltdistor­sion).

Fr. F. wurde bei der ersten Behandlung im Frakturbereich und am Handrücken mit der Continuumtechnik, sowie mit der Triggerbandtechnik am Unterarm behandelt. Die Flexion und Extension des Handgelenkes verbesserte sich sofort und die Schmerzen besserten sich (so sehr, dass keine Schiene, Bandage oder Schlinge mehr erforderlich war). Sie kam zwei Tage später wieder und diesmal wurden Faltechniken angewandt. Bei ihrem nächsten Besuch (fünf Tage später) ging es ihr so viel besser, dass sie vor der Therapie im Warteraum beim Stricken beobachtet wurde.

Abbildung 1-2. FDM-Therapie bei Handgelenksfraktur: (links) Continuumtechnik am Handrücken Continuumdistor­sion (Wiederherstellung der Extension), (Mitte) Einfalttechnik im Bereich der Handgelenksfraktur, (rechts) Entfaltungstechnik der interessären Membran.

DIE FDM BEHANDLUNG VON BESCHWERDEN DER HALS-, BRUST- UND LENDENWIRBELSÄULE

ZERVIKALSYNDROM

Die häufigsten Beschwerden in der Halswirbelsäule und ihre Faziendistorsionen sind:

Beschwerden		Distorsionen
Ziehende Schmerzen von der mittleren BWS zum Nacken	—	Sterntriggerband
Ziehende Schmerzen von der Schulter zum Nacken	—	Trapeziustriggerband
Dumpfer Schmerz tief in der Fossa supraclavicularis	—	Hernierter Triggerpunkt
Schmerzpunkte	—	Continuumdistorsionen
Schmerzen tief in der Wirbelsäule	—	Faltdistorsion
Krämpfe oder allgemeines Unbehagen	—	Zylinderdistorsion
Steifheit und Unbeweglichkeit in den Gelenken	—	Tektonische Fixierung in den Facettengelenken

Zervikalsyndrom und Triggerbänder

„Ziehende“ oder „brennende“ Nackenschmerzen weisen häufig auf ein Triggerband hin. Im Nackenbereich findet man am häufigsten das Sterntriggerband und das Trapeziustriggerband (das auch unter dem Begriff Schulter-Mastoid Triggerband bekannt ist).

Das Sterntriggerband ist das häufigste Triggerband im menschlichen Körper. Es tritt besonders oft bei Frauen auf und ist die Ursache für Nackenschmerzen, Schmerzen in der Brustwirbelsäule und Schulterschmerzen. Schmerzen, die tief unter dem Occiput zu liegen scheinen, sowie brennende oder ziehende Schmerzen von der Brustwirbelsäule zum Nacken sind für den Verlauf dieses Triggerbandes symptomatisch. Das Triggerband beginnt an einem Punkt zwischen dem medialen Rand der Scapula und dem sechsten Brustwirbel und endet am ipsilateralen Mastoid.

Die Triggerbandtechnik für das Sterntriggerband kann entweder im Sitzen oder in Bauchlage ausgeführt werden. Bei der Behandlung werden die zerknitterten Faszienfasern mit den Daumen des Therapeuten über den gesamten Verlauf des Triggerbandes vom Ausgangspunkt bis zum Mastoid glatt gestrichen. Der Druck des Daumens ist zunächst in die Tiefe des Gewebes gerichtet, sobald sich das Triggerband zu bewegen beginnt, wird der Druck nach anterior und kranial gelenkt. Die Bewegung des Triggerbandes ist Hinweis dafür, dass die Verdrehung der getrennten Fasern ihre Position entlang des Triggerbandes ändert und die Fasern einander wieder angenähert werden (der Ziploc®-Beutel wird wieder verschlossen).